

Derm Siliciderm


Se trata de una solución acuosa al 0,5% de manuronato de Silicio que optimiza las condiciones de las proteínas estructurales y funcionales, por lo que tiene funciones reestructurantes y lipolíticas.



Componentes

Silicio Orgánico

Reestructurante que permite mantener el tejido conectivo y tiene un ligero efecto lipolítico.



Indicaciones

- Grasa localizada
- Ayuda en tratamientos de reafirmación y flacidez
- Ayuda a la cicatrización y Post-operatorio
- Aliado en tratamientos de rejuvenecimiento e hipotonía muscular




Beneficios

- Ayuda a estimular la biosíntesis de fibras de colágeno y elastina.
- Ayuda a optimizar los procesos metabólicos.
- Ayuda a disminuir el volumen de las adiposidades y del grosor del panículo adiposo.
- Ayuda a recuperar la elasticidad de la piel y reafirma los tejidos.
- Ayuda a proteger la piel contra los radicales libres y oxidación.



DermöSiliciderm



Protocolo Complementario con otros productos

Paniculo adiposo en pared abdominal

Natural Extracts	5 mL
Carniderm	5 mL
Ampelopderm	5 mL
Cynariderm	5 mL

Entre 4 y 6 sesiones- 1 vez por semana. Hacer drenaje linfático manual 72 horas después de la aplicación.

Abdomen bajo/ Disminución cara interna muslos o brazos

Carniderm + Rutiderm

 $5 \, \text{mL} / 2 \, \text{mL}$

Entre 4 y 6 sesiones- 1 vez por semana. Hacer drenaje linfático manual 72 horas después de la aplicación.

Reafirmación

Piruderm

2 mL

Lift-DMAE 5 mL

Entre 4 y 6 sesiones- 1 vez por semana.

Post-operatorio/ Cicatrices/ Estrías

Centelladerm + Rutiderm

 $5 \, \text{mL} / 2 \, \text{mL}$

Entre 4 y 6 sesiones- 1 vez por semana.

Hacer drenaje linfático manual 72 horas después de la aplicación.

Para tratamiento de post-operatorio se debe iniciar las 2 primeras sesiones aplicando únicamente 2ml de Rutiderm y hacer drenaje manual linfático previo a la aplicación.

